



## Laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego

Zabieg wykonywany jest ze wskazań nagłych. W powłokach brzusznych wykonuje się 3 otwory (5-10 mm), przez które wprowadza się kamerę i narzędzia potrzebne do wykonania zabiegu. Wyrostek zostaje wycięty i usunięty przez jedno z nacięć. Po zabiegu zostają jedynie 3 niewielkie blizny w miejscu nacięcia. W większości wypadków zabieg udaje się wykonać laparoskopowo, jednak czasami konieczna jest konwersja do techniki klasycznej.

**Znieczulenie:** ogólne.

**Średni czas trwania zabiegu:** 30-60 min.

**Wskazania do zabiegu:** zapalenie wyrostka robaczkowego.

**Średnia czas pobytu w szpitalu:** 3-4 dni.

**Dzień zabiegu:** Zabieg wykonywany jest ze wskazań nagłych. Po wykonaniu badań diagnostycznych pacjent operowany jest w dniu przyjęcia.

**Dzień po zabiegu:** Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się w obecności osób trzecich).

**Drugi dzień po zabiegu:** W większości przypadków pacjent zostaje w szpitalu w celu kontroli jego stanu do drugiego dnia po operacji (czasem dzień dłużej). Przed wypisem pacjent jest badany przez lekarza i ma zmieniony opatrunek. Na karcie informacyjnej znajduje się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do dalszego postępowania.

**Odwiedziny:** W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody pielęgniarki lub lekarza.

**Dalsze postępowanie:** Po wyjściu ze szpitala pacjent samodzielnie zmienia opatrunki co 1-2 dni. Po wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. Po ok. 7 dniach od wyjścia ze szpitala pacjent udaje się na wizytę do poradni chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjenta oraz stan gojenia się rany i usuwa szwy.